

CHIRURGIVISION *Plus*

Traitement des rides
aux Botox®

Dr Francis Roy
Chirurgien ophtalmologiste

Qu'est-ce que le Botox®?

- ❑ Produit thérapeutique utilisé en médecine depuis plus de 20 ans
- ❑ Utilisé en esthétique depuis environ 10 ans
- ❑ Approuvé au Canada pour les rides glabellaires depuis mai 2001
- ❑ Est popularisé depuis environ 5 ans (beaucoup plus ces dernières années par la compagnie Allergan)
- ❑ Efficace chez plus de 90% des patients

Comment le Botox® agit?

- ❑ Le Botox® agit en relâchant les muscles qui causent les rides d'expression
- ❑ Par l'inhibition de l'influx nerveux qui contracte les muscles responsables des rides, les muscles se détendent et les rides s'estompent
- ❑ Pas d'allergie au Botox® donc aucun test requis
- ❑ Le Botox® donne un air naturel et détendu
- ❑ N'empêche pas l'utilisation d'autres produits pour remplir les rides qui ne se traitent pas au Botox®

Le traitement des *rides dynamiques* avec le BOTOX®

□ Femme de 39 ans avant et après



Le traitement au BOTOX[®]


- ❑ L'inconfort est minime; il est souvent décrit comme une petite piqûre d'insecte qui dure à peine quelques secondes.
- ❑ Reprise des activités normales immédiatement après l'intervention.
- ❑ Effets apparents après 2 ou 3 jours et atteignent leur maximum après 7 à 10 jours.
- ❑ Ne pas toucher la zone traitée pour 48 heures.
- ❑ Ne pas se coucher immédiatement après le traitement et ce, pour 4 heures.

Effets secondaires les plus fréquents

- ❑ Aucun effet secondaire à long terme n'a été rapporté dans le cas du BOTOX Cosmétique® en plus de dix ans de traitements cliniques.
- ❑ Les effets secondaires les plus courants sont un sensibilité ou une ecchymose au point d'injection.
- ❑ Les effets secondaires plus rares vont des maux de tête aux nausées. L'affaissement temporaire des paupières a aussi été noté mais c'est un phénomène très rare si vous faites affaire à un médecin expérimenté.
- ❑ On conseille d'éviter l'aspirine avant le traitement et d'appliquer une légère pression tout de suite après l'injection, puis de mettre de la glace.

Comment se forment les rides?

- Le mouvement des muscles des sourcils provoque le plissement de la peau.



Comment se forment les rides?

- Avec le temps, comme la peau devient moins élastique, le froncement des sourcils creuse des lignes visibles et les rides apparaissent.



Après le traitement

- ❑ Les premiers effets se manifestent après 3-5 jours
- ❑ Effet maximal après 10 jours
- ❑ Effet dure en moyenne 3-4 mois
- ❑ Grande satisfaction de la clientèle

Autre forme de traitement : hyperhydrose axillaire

- Idéal pour les patients avec sudation excessive
- La dose utilisée sera plus importante que pour la glabelle et les pattes d'oies donc plus dispendieux
- Durée de 3 à 6 mois

Traitement du cou

- Idéal pour les bandes musculaires disgracieuses au niveau du cou et sous le menton
- Améliore également les rides horizontales au niveau du cou
- Durée de 3 à 6 mois

Aussi sur le marché : Juvederm

- ❑ Produit de remplissage le plus populaire actuellement pour corriger les rides
- ❑ Gel visco-élastique
- ❑ Rides et sillons nasogéniens, lèvres, glabelle, rides de la marionnette, etc.
- ❑ Durée de 6-12 mois
- ❑ Effet quasi immédiat
- ❑ Injection prend quelques minutes
- ❑ Pas de convalescence
- ❑ Souvent en combinaison avec le Botox®

Aussi sur le marché : Artécoll

- ❑ Injection permanente au collagène pour combler les rides
- ❑ Rides et sillons nasogéniens, lèvres, glabelle, rides de la marionnette, etc.
- ❑ Résultats durable de 5 à 8 ans
- ❑ Expérience clinique de plus de 15 ans en Europe et environ 8 ans au Québec
- ❑ Résultats définitifs en 3 mois
- ❑ 2-3 traitements peuvent être nécessaires

Merci !

CHIRURGI VISION
Plus
